

Actueel WG van het middel Fytofol 80 WG

24 december 2021

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Wijndruif (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Valse meeldauw ¹	1,8 kg/ha	10	7	28
Gladiool (onbedekte teelt)	Dompelbehandeling	Fusarium ²	0,5% (0,5 kg per 100L water)	1	-	-
Krokus (onbedekte teelt)	Dompelbehandeling	Fusarium ²	0,5% (0,5 kg per 100L water)	1	-	-
Iris (onbedekte teelt)	Dompelbehandeling	Fusarium ²	0,5% (0,5 kg per 100L water)	1	-	-
Tulp (onbedekte teelt)	Dompelbehandeling	Fusarium ²	0,5% (0,5 kg per 100L water)	1	-	-
Narcis m.u.v. grofbollige narcis (onbedekte teelt)	Dompelbehandeling	Fusarium ²	0,5% (0,5 kg per 100L water)	1	-	-
Lelie (onbedekte teelt)	Dompelbehandeling	Fusarium ²	0,5% (0,5 kg per 100L water)	1	-	-
Hyacint (onbedekte teelt)	Dompelbehandeling	Fusarium ²	0,5% (0,5 kg per 100L water)	1	-	-
Bloembollen en bloemknollen (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Grauwe schimmel ³	1,0 kg/ha	2	7	-

Toelatingsnummer 16311 N

¹ Valse meeldauw (*Plasmopara viticola*)

² Fusarium (*Fusarium* spp.)

³ Grauwe schimmel (*Botrytis* spp.)

Toepassingsvoorwaarden

In de teelt van wijndruif het middel toepassen in 1000 tot 1200 liter water per ha.

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing in de teelt van druiven op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan wanneer in de eerste 20 meter grenzend aan het oppervlaktewater het middel verspoten wordt met een Venturidop met ventilatorstand laag, waarbij de laatste gewasrij éénzijdig in de richting van het perceel bespoten dient te worden, in combinatie met een teeltvrije zone van 4,5 meter (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij tot aan de insteek van de sloot).

Om de zoogdieren te beschermen is toepassing in de teelt van bloembollen en bloemknollen uitsluitend toegestaan voordat een bodembedekking van maximaal 25% is bereikt.

In de teelt van bloembollen en bloemknollen is het maximale aantal toepassingen 2. Dit kan onvoldoende zijn voor een volledige bestrijding van Grauwe schimmel. Het wordt daarom aangeraden het middel af te wisselen met toegelaten middelen op basis van andere actieve stoffen.